

Annexe

PROGRAMME DE CHIMIE

Partie I

	COMMENTAIRES
<p>Atomistique</p> <ul style="list-style-type: none"> - Structure atomique de la matière : généralités sur la structure de l'atome. - Quantification de l'énergie des atomes. - Atome à un électron. - Atome à plusieurs électrons. - Utilisation de la classification périodique. - Molécules diatomiques et polyatomiques. - Différents types de liaisons : <ul style="list-style-type: none"> . liaisons chimiques, . liaison covalente simple, multiple, . liaison ionique, . liaison métallique. 	<p>En aucun cas, les notions relatives à ce chapitre ne pourront constituer le corps du ou des problèmes de l'épreuve de chimie du concours.</p> <p>L'hybridation et les orbitales moléculaires font l'objet de la partie II.</p>
<p>Thermodynamique</p> <ul style="list-style-type: none"> - Définition des fonctions d'État : U, H, S, G, F et A. <p>On insistera sur les notions d'avancement de potentiel chimique et sur leurs utilisations. À cet effet, la présentation et l'utilisation des tables de données thermodynamiques sont indispensables.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les applications des fonctions d'état aux calculs des grandeurs thermodynamiques nécessaires pour l'étude des transformations physico-chimiques doivent être envisagées dans le cadre des mélanges idéaux et ce, en milieu homogène. 	<p>Pour les réactions en solution, les questions ne pourront porter que sur les réactions acido-basiques.</p>
<p>Cinétique</p> <ul style="list-style-type: none"> - Définition de la vitesse de réaction en milieu homogène. - Facteurs influençant la vitesse : concentration et température. - Notion d'ordre, d'énergie d'activation. - Établissement d'une équation de vitesse à partir des données expérimentales. - Réactions composées : opposées, parallèles, consécutives. - Liens avec la thermodynamique. 	<p>Seuls les systèmes fermés sont au programme du concours.</p> <p>Les questions pourront porter sur des réactions en phase gazeuse (selon le modèle du gaz parfait) ou des réactions en phase liquide.</p> <p>Les questions pourront porter sur des exemples concrets tirés des chapitres de chimie inorganique et organique pour présenter les approximations de l'état quasi-stationnaire ou de l'état d'équilibre.</p>

	COMMENTAIRES
<p>Chimie organique</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formules brute, développée, semi-développée ; nomenclature. - Isomérisation et stéréoisomérisation. - Définir les grandes fonctions en chimie organique : alcane, alcène, diène conjugué, alcyne, aromatique, halogénoalcane, organomagnésien mixte, alcool, phénol, amine, dérivé carbonyle, acide carboxylique, dérivés des acides carboxyliques, acide aminé. - Présentation des réactions de substitution et de leurs mécanismes à propos des fonctions suivantes : dérivé monohalogéné d'alcane, alcool. - Présentation des réactions d'estérification et de saponification et de leurs mécanismes à propos des fonctions suivantes : acide carboxylique et ester. 	
<p>Chimie inorganique</p> <ul style="list-style-type: none"> - Empilements, cubique centré, cubique face centrée et hexagonal compact, dans le cadre de la sphère dure. 	

Partie II

	COMMENTAIRES
<p>Atomistique</p> <ul style="list-style-type: none"> - Molécules diatomiques et polyatomiques Hybridation, orbitales moléculaires. - Liaisons intermoléculaires Liaison hydrogène, force de Van der Waals. 	<p>En aucun cas, les notions relatives à ce chapitre ne pourront constituer le corps du ou des problèmes de l'épreuve de chimie du concours.</p> <p>Les questions au concours ne pourront porter que sur la notion d'hybridation atomique limitée aux seuls cas sp³, sp², sp¹.</p>

	COMMENTAIRES
<p>Thermodynamique</p> <p>Les applications des fonctions d'état aux calculs des grandeurs thermodynamiques nécessaires pour l'étude des transformations physico-chimiques doivent être envisagées dans le cadre du corps pur et des mélanges idéaux et ce, en milieu homogène et hétérogène.</p>	<p>Les questions au concours pourront porter sur les réactions de complexation, d'oxydoréduction et de précipitation.</p>
<p>Cinétique</p> <p>Réactions complexes.</p>	<p>Les questions au concours se limiteront aux réactions en chaîne.</p>
<p>Chimie organique</p> <p>- Effets électroniques.</p> <p>- Complément des mécanismes réactionnels : substitutions électrophile, radicalaire ; élimination ; addition.</p> <p>- Les réactions de polymérisation seront abordées dans le cas de l'éthène et du propène.</p>	<p>Il est souhaitable que les connaissances en chimie organique soient acquises fonction par fonction et mécanisme par mécanisme aux fins de pouvoir résoudre des exercices de synthèse directe et de rétrosynthèse.</p> <p>La réaction d'hydroboration fait partie des réactions d'addition. Les mécanismes des réactions de réduction et d'oxydation ne peuvent être sujets à questions de cours au concours mais peuvent figurer dans des exercices de synthèse.</p> <p>Le mécanisme des réactions de transposition est hors programme du concours.</p>
<p>Chimie inorganique</p> <p>- État solide : les différents types de solides cristallisés, moléculaire, covalent, métallique et ionique, seront envisagés.</p> <p>- Les oxydes : propriétés composées.</p>	<p>L'étude simplifiée sera conduite de manière comparative en fonction des familles d'éléments de la classification périodique.</p>
<p>Application à quelques procédés</p> <p>Notion de bilan matière dans un système ouvert.</p>	<p>L'ensemble de toutes les notions du programme du concours doit permettre d'élaborer de façon simple le principe de la structure d'un procédé industriel.</p>

PROGRAMME DE PHYSIQUE

Partie I

	COMMENTAIRES
<p>Électromagnétisme Phénomènes stationnaires Électrostatique :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Loi de Coulomb - Le champ électrostatique E - Potentiel scalaire V, énergie électrostatique d'une charge dans un champ E. - Distributions discrètes et continues de charges, principe de Curie, emploi de symétries. - Théorème de Gauss, forme intégrale et locale. - Dipôles dans un champ électrostatique, polarisation induite. - Loi de Poisson. - Conducteurs en équilibre et sous influence totale : condensateurs, constante diélectrique. <p>Magnétostatique :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Force de Lorentz, loi de Laplace, loi de Biot et Savart. - Le champ magnétostatique B. - Distribution de courants, emploi des symétries. - Flux du champ magnétique - potentiel vecteur. - Théorème d'Ampère, circulation du champ magnétostatique. - Le dipôle magnétique, énergie potentielle magnétique. <p>Phénomènes dépendant du temps Induction magnétique :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Loi de Faraday, loi de Lentz. - Circuit mobile dans un champ constant, système rigide dans un champ variable. - Forme locale de la loi de Faraday. - Inductances. <p>Équations de Maxwell - Ondes électromagnétiques :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Équations de Maxwell dans le vide. - Ondes électromagnétiques dans le vide et les milieux Ih non magnétiques. <p>Circuits électriques Lois générales dans l'approximation des régimes quasi stationnaires :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phénomène de conduction, vecteur densité de courant. - Conductivité, loi d'Ohm. - Générateur et récepteur, bilan d'énergie et de puissance. <p>Dipôles linéaires, modélisation :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Caractéristiques d'un dipôle électrocinétique. - Association série et parallèle. - Diviseur de tension et de courant. - Générateurs de tension et de courant (modèles de Thévenin et de Norton). - Source indépendante, source liée. - Couplage magnétique idéal. 	<p>Les C_{ij} sont hors programme</p> <p>Le calcul direct du potentiel vecteur est hors programme.</p> <p>Concernant les caractéristiques, on se bornera à constater la linéarité des dipôles. Le couplage magnétique est utilisé dans les circuits simples à petit nombre de mailles.</p>

	COMMENTAIRES
<p>Réseaux de dipôles linéaires :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Théorème de superposition. - Théorème de Thévenin. - Théorème de Norton. - Théorème des potentiels de nœuds (Millman) <p>Régime sinusoïdal forcé :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grandeurs efficaces. - Impédance et admittance complexes. - Notions d'impédances d'entrée et de sortie. - Puissance moyenne, adaptation, facteur de puissance. - Fonctions de transfert, diagramme de Bode (réel et asymptotique), pulsation ou fréquence de coupure, bande passante. - Étude du circuit RLC série ou parallèle, résonance, antirésonance, facteur de qualité. <p>Électronique :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Amplificateur opérationnel idéalisé. - Montages de base : amplificateur non inverseur et inverseur, suiveur. - Montages intégrateur et dérivateur. - Filtrage actif. <p>Thermodynamique</p> <p>Introduction à la thermodynamique :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Objet de la thermodynamique - Systèmes thermodynamiques. Systèmes fermés, ouverts, isolés - Variables thermodynamiques. - Évolutions d'un système thermodynamique. Équilibre thermodynamique. - Transformations réversibles. Transformations irréversibles. - Fonctions d'état. Équation d'état : le gaz parfait. - Coefficients thermoélastiques ; application au gaz parfait. <p>Énergie d'un système - Premier principe de la thermodynamique :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Étude qualitative des différents modes de transfert de l'énergie. - Transfert mécanique W (travail), transfert thermique Q (chaleur), transfert radiatif (rayonnement). Bilan énergétique. <p>Premier principe de la thermodynamique. Enthalpie. Capacités thermiques.</p> <p>Deuxième principe de la thermodynamique. Entropie :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Énoncés du deuxième principe de la thermodynamique. - Température thermodynamique. - Fonctions entropie. Bilan entropique. Diagramme entropique. 	<p>La méthode de résolution est laissée au choix de l'étudiant (analyse par maille ou par nœud, écriture directe ou matricielle...).</p> <p>La notion de puissance réactive et le théorème de Boucherot sont hors programme.</p> <p>On se limite à des circuits à petit nombre de mailles modélisant des filtres du 1er ou du 2ème ordre (comportement asympt. HF ou BF).</p> <p>On se limite à des filtres du 1er ou du second ordre.</p> <p>On insistera sur ces concepts fondamentaux.</p> <p>On se limitera aux systèmes fermés.</p>

	COMMENTAIRES
<p>Optique ondulatoire :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nature ondulatoire de la lumière. Description qualitative de la diffraction. - Interférences non localisées de deux ondes mutuellement cohérentes. Notions élémentaires sur la cohérence spatiale et temporelle. Exemple de l'interféromètre de Michelson. - Interférences de N ondes cohérentes de même amplitude. <p>Mécanique quantique</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le photon (effet photoélectrique). - Atome de Bohr. - Description quantique d'une particule. - Dualité onde-corpuscule. Fonction d'onde, équation de Schrödinger. Relation d'incertitude d'Heisenberg. - États stationnaires. Étude de systèmes à une dimension : barrière, puits d'énergie potentielle. 	<p>Ce chapitre n'est pas au programme de l'épreuve écrite.</p>

Partie II

	COMMENTAIRES
<p>Électromagnétisme</p> <p>Phénomènes stationnaires</p> <p>Électrostatique :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Développement multipolaire. - Énergie électrostatique : densité, forces entre conducteurs. <p>Magnétostatique :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Force de Laplace sur un circuit filiforme. - Travail dans un champ magnétostatique. - Théorème de Maxwell. - Aimantation, diamagnétisme, paramagnétisme, ferromagnétisme, hystérésis. <p>Phénomènes dépendant du temps</p> <p>Induction magnétique :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Énergie d'un système de courants. <p>Équations de Maxwell - Ondes électromagnétiques :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Énergie électromagnétique. - Vecteur de Poynting, puissance rayonnée. - Ondes électromagnétiques au voisinage d'un conducteur. - Propagation guidée, vitesse de phase, vitesse de groupe. 	<p>Ces notions seront abordées qualitativement.</p> <p>Uniquement dans le câble coaxial et entre plans conducteurs.</p>

	COMMENTAIRES
<p>Circuits électriques Régime transitoire : - Dipôles (R, L, C). - Établissement et rupture d'un régime continu dans un condensateur, une bobine, les associations série et parallèle. - Circuits oscillants. - Bilan énergétique.</p> <p>Thermodynamique Théorie cinétique du gaz parfait : - Modèle du gaz parfait. - Température et pression cinétiques. - Énergie interne du gaz parfait monoatomique en équilibre à la température T. - Équation du gaz parfait. - Distribution des vitesses.</p> <p>Fonctionnement des machines thermiques : - Cycles monothermes. - Cycles dithermes : moteur ($W < 0$), Récepteur ($W > 0$). - Cycle de Carnot.</p> <p>Optique et physique des ondes Optique géométrique : - Définitions photométriques : flux, intensité, luminance, éclairement. - Principe de Fermat et déduction des lois de Descartes. - Théorème de Malus. - Dioptries, vergence des lentilles minces. - Éléments cardinaux des systèmes centrés.</p> <p>Optique ondulatoire : - Ondes à trois dimensions : ondes planes, ondes sphériques. - Diffraction : principe de Huygens-Fresnel. - Diffraction de Fraunhofer d'une onde plane par une ouverture rectangulaire. Cas de la fente - Fentes d'Young, réseaux. - Rôle de la diffraction dans les instruments d'optique.</p> <p>Mécanique quantique : - Effet tunnel.</p>	<p>L'étude est limitée aux circuits du 1er et du second ordre. Ils sont en régime libre ou soumis à des échelons de tension ou de courant. L'établissement d'un régime sinusoïdal dans un circuit quelconque est hors programme.</p> <p>Le calcul s'effectuera par la méthode des collisions. La méthode du viriel est hors programme.</p> <p>Le principe d'Huygens-Fresnel est simplement énoncé. On donnera l'allure de la figure de diffraction par une ouverture circulaire. Lames minces hors programme.</p> <p>Ce chapitre n'est pas au programme de l'épreuve écrite.</p>

PROGRAMME DE MÉCANIQUE

Partie I

	COMMENTAIRES
<p>Mécanique du point matériel</p> <p>Cinématique du point matériel :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Référentiels, systèmes de coordonnées. Changement de référentiels, lois de composition des vitesses et des accélérations. <p>Dynamique du point matériel :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Référentiels galiléens. Lois de Newton : principe de l'inertie, loi fondamentale, loi des actions réciproques. - Référentiels non galiléens, forces d'inertie. - Théorèmes de la quantité de mouvement, du moment cinétique et de l'énergie cinétique. - Énergie potentielle, énergie mécanique. - Gravitation, applications à la dynamique terrestre. - Mouvement d'un point matériel soumis à une force centrale en $1/r^2$. Lois de Képler. - Oscillateur harmonique à une dimension. 	
<p>Mécanique du solide</p> <p>Cinématique du solide :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Définition du solide. Degrés de liberté. Champ de vitesses d'un solide. <p>Cinétique du solide :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masse, centre de masse et moment d'inertie. référentiel du centre de masse. - Quantité de mouvement, moment cinétique, moment dynamique. <p>Énergie cinétique.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Théorèmes de Koenig. <p>Dynamique du solide :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Modélisation des actions mécaniques. - Théorèmes généraux : de la quantité de mouvement, du moment cinétique et de l'énergie, appliqués au solide en rotation autour d'un axe de direction fixe. 	<p>Les angles d'Euler ne sont pas au programme du concours.</p> <p>Le calcul des moments d'inertie n'est pas demandé. L'opérateur d'inertie n'est pas au programme de la partie I.</p> <p>L'étude des liaisons n'est pas au programme de la partie I.</p>
<p>Mécanique des fluides</p> <p>Statique des fluides : équation fondamentale. Cas d'un fluide isovolume et homogène. Poussée d'Archimède.</p> <p>Dynamique des fluides non visqueux : équations de Bernoulli dans le cas d'écoulements simples.</p>	

Partie II

	COMMENTAIRES
<p>Mécanique du point matériel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Liaison parfaite ou avec frottement sec. Lois de Coulomb. - Frottement visqueux. - Problème à 2 corps, réduction canonique (masse réduite...). - Collision élastique de 2 particules ponctuelles. - Oscillateur amorti, forcé, résonance. Impédance mécanique. 	
<p>Mécanique du solide</p> <ul style="list-style-type: none"> - Opérateur d'inertie du solide. - Torseurs cinématique, cinétique, dynamique et des actions mécaniques. - Puissance des actions mécaniques intérieures et extérieures d'un système de solides. - Cinématique de contact. Glissement, roulement et pivotement. - Frottement de glissement. - Les liaisons parfaites et leur classification (pivot, glissière, pivot glissant, rotule et appui plan). - Application des théorèmes généraux aux mouvements de systèmes de solides. 	<p>Les angles d'Euler ne sont pas au programme.</p> <p>Les frottements de pivotement et de roulement ne sont pas au programme.</p>
<p>Mécanique des fluides</p> <ul style="list-style-type: none"> - Théorème d'Euler sur un tube de courant. 	

PROGRAMME DE MATHÉMATIQUES

DÉLIMITATION DU PROGRAMME

Quand il est indiqué que telle notion (ou tel résultat) n'est pas exigible des candidats cela signifie que, même si ils en ont connaissance, on n'attend pas des candidats qu'ils utilisent cette notion (ou ce résultat) pour aborder ou résoudre les problèmes qui leur seront soumis lors des épreuves. Quand il est indiqué qu'un résultat est en dehors du programme du concours cela signifie que ce résultat n'est pas exigible des candidats lors des épreuves. Quand il est indiqué qu'une étude est en dehors du programme du concours, cela signifie que non seulement ses résultats sont en dehors du programme du concours mais également toutes les méthodes spécifiques à l'étude. Quand il est utilisé la locution "définition de..." ou "notion de..." cela signifie que seule la définition ou la notion est exigible des candidats mais que l'on n'attend pas qu'ils aient connaissance de ses développements sauf, le cas échéant, de ceux qui sont précisés plus avant dans le programme du concours.

Partie I

	COMMENTAIRES
<p>Analyse</p> <p>Les notions d'espace topologique, d'espace métrique et le vocabulaire topologique associé sont en dehors du programme du concours. La notion d'espace vectoriel normé ne figure pas au programme de cette première partie.</p> <p>Dans ce qui suit R désigne le corps des réels, Q celui des rationnels et C celui des complexes.</p> <p>1 - Les nombres réels</p> <p>Propriétés des nombres réels</p> <p>Relation d'ordre, partie entière, valeur absolue, intervalles (ouverts, fermés, semi-ouverts), majorations et minorations, borne supérieure et inférieure. Les candidats doivent connaître la propriété "une partie non vide et majorée de R admet une borne supérieure" et savoir l'utiliser à bon escient (suites monotones et adjacentes, en particulier).</p> <p>Suites de nombres réels</p> <p>Définition d'une suite de réels, d'une suite extraite. Définition d'une suite convergente et de sa limite.</p> <p>R-algèbre des suites convergentes et opérations algébriques sur les limites. Comparaisons (notations O et o, équivalence). Définition d'une suite de Cauchy. Une suite de nombres réels est convergente si et seulement si elle est de Cauchy (le "si" est admis). Densité de Q dans R et approximation décimale. Théorème de Bolzano-Weierstrass.</p>	<p>Aucun procédé de construction de R n'est exigible des candidats. L'existence de R, le théorème de la borne supérieure et la densité de Q dans R sont considérés comme des résultats admis.</p> <p>Les notions de limite sup et de limite inf ne sont pas au programme. La démonstration du théorème de Bolzano-Weierstrass n'est pas exigible des candidats.</p>
<p>2 - Fonctions réelles d'une variable réelle</p> <p>Propriétés locales</p> <p>Limite en un point $a \in \mathbf{R}$ et en $\pm \infty$, limites à droite et à gauche. Continuité en un point $a \in \mathbf{R}$. Opérations algébriques sur les limites, limite d'une fonction composée. Relations de comparaison, équivalence et développements limités.</p>	

	COMMENTAIRES
<p>Fonctions continues sur un intervalle R-algèbre $C(I)$ des fonctions continues sur un intervalle I. Continuité d'une fonction composée, continuité de f. L'image continue d'un intervalle est un intervalle et l'image continue d'un segment est un segment (les deux résultats sont admis). Une application $f \in C(I)$ est bijective si et seulement si elle est monotone, son application réciproque est alors continue sur $f(I)$.</p> <p>Calcul différentiel Dérivée en un point, dérivées à droite et à gauche. Opérations algébriques sur les dérivées. Dérivée d'une fonction composée. Fonction dérivée d'une fonction définie sur un intervalle. Dérivée d'une fonction réciproque. R-algèbre $C^r(I)$ des fonctions de classe C^r sur un intervalle I. Théorème de Rolle ; théorème des accroissements finis et applications usuelles. Formule de Taylor-Lagrange à l'ordre p pour une fonction de classe C^{p+1}. Formule de Taylor-Young à l'ordre p pour une fonction de classe C^r et calcul du développement limité à l'ordre p en un point $a \in I$ d'une fonction de $C^r(I)$.</p> <p>Intégration Définition de l'intégrale d'une fonction en escalier sur un segment. Approximation des fonctions continues par des fonctions escalier : on admet que si f est continue sur $[a,b]$, pour tout $\varepsilon > 0$ il existe des fonctions φ et ψ, en escalier sur $[a,b]$, telles que : $\varphi \leq f \leq \psi$ et telles que : $\forall x \in [a,b] : \psi(x) - \varphi(x) < \varepsilon$. Définition de l'intégrale d'une fonction continue sur un segment. Linéarité, monotonie et relation de Chasles, intégrale des fonctions continues par morceaux. Relation : $\left \int_a^b f(t) dt \right \leq \int_a^b f(t) dt$ et première formule de la moyenne pour les fonctions continues. Le théorème suivant : "Une fonction continue et positive, définie sur un segment $[a,b]$, est nulle si et seulement si son intégrale est nulle" doit être connu. Primitives d'une fonction continue. Intégration par parties des fonctions de classe C^1. Changement de variable. Formule de Taylor-Lagrange avec reste intégral. Primitives des fractions rationnelles n'ayant que des pôles simples ou doubles. Primitives des fractions rationnelles en sin et cos.</p> <p>Intégrales généralisées absolument convergentes Définition de l'intégrale, sur un intervalle quelconque, d'une fonction continue positive ; théorème de comparaison, équivalents. Définition d'une fonction continue absolument intégrable à valeurs réelles et définition de son intégrale généralisée. Changement de variable dans les intégrales généralisées de fonctions absolument intégrables.</p>	<p>La notion de continuité uniforme n'est pas au programme du concours.</p> <p>La définition générale d'une fonction intégrable au sens de Riemann n'est pas au programme.</p>

	COMMENTAIRES
<p>Applications</p> <p>Discussion d'une équation $f(x)=0$, et résolution approchée (par la méthode de Newton, par dichotomie). Étude de suite récurrentes : $u_{n+1}=f(u_n)$. Approximation de l'intégrale d'une fonction continue par ses sommes de Riemann et interprétation géométrique de l'intégrale.</p> <p>Calcul approché d'une intégrale par la méthode des trapèzes et par la méthode de Simpson. Comportement (dérivées, primitives, représentation graphique, utilisations des développements limités) des fonctions Ln, sin, cos, tan et de leurs réciproques, des fonctions sinh, cosh, tanh, des polynômes et des fractions rationnelles et des fonctions du type : $x \in]0, +\infty[\rightarrow x^\alpha$. Croissances comparées et nature des intégrales généralisées - là où elles sont définies - des fonctions, $x^\alpha, (Ln x)^\alpha, e^{\alpha x}$ et de leurs produits.</p>	
<p>3 - Nombres complexes</p> <p>Corps \mathbf{C} des complexes : les nombres complexes $x + iy$ sont les points (x, y) du plan Euclidien $\mathbf{R} \times \mathbf{R}$ sur lequel est défini, de plus, une multiplication.</p> <p>Définition de $e^{i\theta} = \cos(\theta) + i\sin(\theta)$, formules d'Euler et formule de Moivre. Définition de l'exponentielle d'un nombre complexe $e^{x+iy} = e^x e^{iy}$ et des fonctions associées (sin, cos, tan, sinh, cosh, tanh). Module et argument d'un nombre complexe. Résolution dans \mathbf{C} de $z^n = a$, racines de l'unité. Les candidats doivent connaître les interprétations géométriques des transformations : $z \rightarrow \bar{z}, z \rightarrow a+z, z \rightarrow az+b$. Inégalité triangulaire. Suites de nombres complexes. Suite convergente et limite. Critère de Cauchy pour les suites de nombres complexes.</p>	<p>Toute autre construction de \mathbf{C} est en dehors du programme du concours.</p>
<p>4 - Séries de nombres réels ou complexes</p> <p>Définition d'une série. Définition d'une série convergente et de sa somme. Condition de Cauchy : une série est convergente si et seulement si la suite de ses sommes partielles est de Cauchy. Séries absolument convergentes. Espace vectoriel des séries convergentes.</p> <p>Séries à termes réels positifs : séries de Riemann et série géométrique. Théorème de comparaison, règle de d'Alembert utilisant la limite usuelle.</p> <p>Convergence d'une série alternée dont la valeur absolue du terme général décroît vers 0 et majoration du reste.</p>	<p>Le théorème sur la série produit n'est pas au programme de cette partie.</p> <p>Aucune autre règle générale pour les séries à termes positifs n'est exigible des candidats.</p> <p>Aucun autre résultat sur les séries semi-convergentes n'est exigible des candidats.</p>

	COMMENTAIRES
<p>5 - Équations différentielles</p> <p>Définition d'une solution de l'équation différentielle $y' = f(y, t)$ sur un intervalle I de \mathbf{R} et interprétation graphique. Résolution de l'équation $a(t)y' + b(t)y = c(t)$, où (a, b, c) sont continues à valeurs dans \mathbf{R}. Existence et unicité de la solution sur un intervalle I, pour une condition initiale donnée, si a ne s'annule pas sur I. Structure des solutions. Résolution de l'équation $ay'' + by' + cy = f$, où (a, b, c) sont des constantes réelles. Seul le cas où f est somme de fonctions du type $t \rightarrow e^{\alpha t} P(t)$, avec $\alpha \in \mathbf{R}$ et $P \in \mathbf{R}[X]$ est exigible des candidats. Existence et unicité de la solution sur \mathbf{R} pour une condition initiale donnée.</p>	<p>Pour tout autre type d'équations différentielles, aucun théorème général d'existence et d'unicité pour le problème de Cauchy n'est au programme. La notion de solution maximale n'est pas au programme.</p>
<p>6 - Séries entières de la variable réelle</p> <p>Définition d'une série entière $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$ de la variable réelle x associée à la suite de nombres réels a_n. Définition du rayon de convergence R. Règles de d'Alembert et de Cauchy. La somme est de classe C^∞ sur $] -R, R[$ quand $R > 0$: intégration et dérivation termes à termes. Définition d'une fonction développable en série entière au voisinage d'un point $x_0 \in \mathbf{R}$. Développements en série entière des fonctions usuelles au voisinage d'un point x_0. Applications : utilisation du développement en série entière pour l'approximation de fonctions ; emploi des séries entières dans la recherche de solutions d'équations différentielles linéaires à coefficients non constants.</p>	<p>L'étude générale des suites et des séries de fonctions n'est pas au programme de cette partie.</p>
<p>7 - Notions sur les fonctions de deux variables réelles à valeurs dans \mathbf{R} ou \mathbf{R}^2. Coordonnées polaires et cylindriques</p> <p>Définition de la norme Euclidienne et de la norme sup sur \mathbf{R}^2 : interprétation géométrique des boules et équivalence des deux normes. Définition d'un ouvert non vide : réunion de disques ouverts.</p> <p>Définition d'une application continue en un point $a \in \mathbb{A}$. Espaces $C^0(\mathbb{A}, \mathbf{R})$ et $C^0(\mathbb{A}, \mathbf{R}^2)$. Définition d'une dérivée partielle. Définition d'une application de classe C^1 : application ayant des dérivées partielles qui, de plus, sont continues sur \mathbb{A}. Théorème fondamental (admis) : une application de classe C^1 admet une différentielle. Différentielle de la composée de deux applications de classe C^1 et pratique du calcul des dérivées partielles des fonctions composées. Définition du gradient dans le cas où l'espace image est \mathbf{R} et interprétation géométrique. Définition d'un changement de variables dans \mathbf{R}^2. Définition des coordonnées polaires et extension aux coordonnées cylindriques. Pratique des changements de variables dans les calculs des dérivées partielles. Définition d'une application de classe $C^k(\mathbb{A}, \mathbf{R})$ ($k \geq 1$) : application définie sur \mathbb{A} dont toutes les dérivées partielles jusqu'à l'ordre k inclus sont continues. Théorème de Schwarz (admis) pour les applications de classe $C^2(\mathbb{A}, \mathbf{R})$.</p>	<p>Il s'agit essentiellement d'une pratique et cette partie du programme ne pourra en aucun cas constituer le corps de l'épreuve écrite. Toutes les applications dont il est question ici sont définies sur un ouvert de \mathbf{R}^2 à valeurs dans \mathbf{R} ou \mathbf{R}^2. L'étude des normes de \mathbf{R}^2 n'est pas au programme de cette partie.</p>

	COMMENTAIRES
<p>Algèbre</p> <p>1 - Ensembles. Entiers naturels.</p> <p>Algèbre des parties. Dénombrement. Arrangements, permutations et combinaisons. Notations $n!$, A_n^p et C_n^p (ou $\binom{n}{p}$). Triangle de Pascal. Notions d'arithmétique dans \mathbf{Z}.</p>	<p>Les candidats doivent connaître le vocabulaire usuel sur les ensembles. Aucune connaissance sur la théorie axiomatique des ensembles et sur le calcul propositionnel n'est exigible des candidats.</p> <p>L'existence de \mathbf{N} est admise. Aucune connaissance axiomatique concernant la construction de \mathbf{N} n'est exigible des candidats.</p> <p>Aucune connaissance sur la construction de \mathbf{Z}, de \mathbf{Q} ou de \mathbf{R} n'est exigible des candidats.</p>
<p>2 - Polynômes et fractions rationnelles</p> <p>Polynômes à une indéterminée sur \mathbf{K} Définition de l'ensemble $\mathbf{K}[X]$ des polynômes à une indéterminée sur \mathbf{K}, degré, valuation. Espace vectoriel $\mathbf{K}_n[X]$ des polynômes de degré inférieur ou égal à n. Multiples et diviseurs d'un polynôme, division Euclidienne. Dérivation, formule de Taylor et ordre de multiplicité d'une racine. Théorème fondamental de d'Alembert-Gauss dans $\mathbf{C}[X]$ (admis), polynômes irréductibles dans $\mathbf{C}[X]$ et $\mathbf{R}[X]$. Décomposition d'un polynôme en produit de polynômes irréductibles. Application à la factorisation de $a+X^n$ dans $\mathbf{C}[X]$.</p> <p>Fractions rationnelles sur \mathbf{K} Définition de l'ensemble $\mathbf{K}(X)$ des fractions rationnelles sur \mathbf{K}, degré, partie entière, parties polaires, pôle simple et multiple. Existence et unicité de la décomposition en éléments simples des fractions de $\mathbf{C}(X)$ sur \mathbf{C}. Pratique de la décomposition en éléments simples sur \mathbf{C} des fractions à pôles simples ou doubles, cas de $P(X)/(a+X^n)$. Pratique de la décomposition en éléments simples sur \mathbf{R} des fractions de $\mathbf{R}(X)$.</p>	<p>Dans cette section \mathbf{K} désigne \mathbf{R} ou \mathbf{C}. Aucune connaissance sur la construction de $\mathbf{K}[X]$ ou de $\mathbf{K}(X)$ n'est exigible des candidats.</p> <p>La notion de polynômes premiers entre eux et le théorème de Bezout ne sont pas exigibles des candidats, de même que la division selon les puissances croissantes.</p> <p>La démonstration de l'existence et de l'unicité de la partie polaire relative à un pôle n'est pas exigible des candidats.</p>
<p>3 - Espaces vectoriels et algèbre linéaire</p> <p>Définitions générales Définition d'un espace vectoriel, d'un sous espace, d'une application linéaire, d'un endomorphisme, d'un isomorphisme, d'un automorphisme, d'une forme linéaire. Définition d'une algèbre (associative, unitaire). Définition de l'espace $L(E,F)$ des applications linéaires de E dans F. Définition du noyau et de l'image d'une application linéaire. Définition d'une combinaison linéaire, d'un sous espace engendré par une partie, de la somme de deux sous espaces, de deux sous espaces supplémentaires. Définition d'une homothétie et caractérisation des projecteurs par la relation $p^2 = p$.</p>	<p>On ne considère ici que des espaces vectoriels sur \mathbf{K} avec $\mathbf{K}=\mathbf{R}$ ou $\mathbf{K}=\mathbf{C}$. Sauf pour ce qui concerne les définitions générales, seuls les espaces de dimension finie sont au programme du concours.</p>

	COMMENTAIRES
<p>Généralités sur les espaces de dimension finie Définition d'une famille libre, d'une famille liée, d'une famille génératrice, d'une base, d'un espace de dimension finie. Invariance du nombre d'éléments d'une base et théorème de la base incomplète, sous-espaces et somme de sous-espaces, espaces \mathbf{K}^n. Caractérisations des applications linéaires entre espaces de dimension finie. Formes linéaires : définition du dual et équation d'un hyperplan. Rang d'une famille de vecteurs, rang d'une application linéaire, théorème du rang et caractérisation des isomorphismes.</p> <p>Calcul matriciel Espace $M_{n,p}(\mathbf{K})$ des matrices à n lignes et p colonnes à coefficients dans \mathbf{K} et produit matriciel. Algèbre $M_n(\mathbf{K})$, groupe $GL_n(\mathbf{K})$. Matrice d'une application linéaire entre deux espaces de dimension finie, isomorphisme entre $M_{n,p}(\mathbf{K})$ et $L(E,F)$, rang d'une matrice. Définition de la transposée d'une matrice, d'une matrice carrée symétrique ou antisymétrique. Matrice d'un endomorphisme sur une base, changements de base, matrices semblables. Trace d'une matrice carrée et relation : $\text{Tr}(AB) = \text{Tr}(BA)$.</p> <p>Systèmes linéaires Discussion des systèmes linéaires : description de l'espace des solutions. Inversion et inversibilité d'une matrice carrée par la méthode du pivot et application à la résolution des systèmes de Cramer.</p> <p>Déterminants Définition du groupe des permutations d'un ensemble fini, définition d'une transposition et de la signature d'une permutation : $(-1)^p$ où p est la parité de la décomposition en transpositions.</p> <p>Formes n-linéaires alternées sur un espace de dimension n, déterminant sur une base d'un système de vecteurs, changement de base, orientation. Déterminant d'une application linéaire, déterminant d'une matrice carrée. Caractérisation d'une base, d'un isomorphisme, d'une matrice carrée inversible. Déterminant de la composée de deux endomorphismes, du produit de deux matrices carrées. Développement par rapport à une ligne ou une colonne, cofacteurs et matrice des cofacteurs, déterminant de la transposée d'une matrice carrée. Déterminants extraits et caractérisation du rang d'une matrice.</p>	<p>Le théorème de Rouché-Fontené, les notions de matrices bordantes et de déterminants caractéristiques ne sont pas exigibles des candidats.</p> <p>L'invariance de la parité de la décomposition d'une permutation en produit de transpositions est admise.</p>

	COMMENTAIRES
<p>Réduction des endomorphismes et des matrices carrées</p> <p>Définition d'une valeur propre d'un endomorphisme, d'un vecteur propre associé (0 n'est pas vecteur propre), d'un sous espace propre. Définition du polynôme caractéristique d'un endomorphisme, de la trace d'un endomorphisme. Ordre de multiplicité d'une valeur propre. Exemples classiques : homothéties, projecteurs, symétries. Définition d'un endomorphisme diagonalisable : l'espace est somme directe des sous espaces propres, caractérisation des endomorphismes diagonalisables : l'ordre de multiplicité d'une valeur propre est égale à la dimension du sous espace propre associé.</p> <p>Définition d'une valeur propre d'une matrice de $M_n(\mathbf{K})$ associée à un endomorphisme de \mathbf{K}^n, d'un vecteur propre associé et d'un sous espace propre. Polynôme caractéristique d'une matrice carrée et invariance par changements de base. Matrices diagonalisables et caractérisation des matrices diagonalisables.</p>	<p>Les candidats doivent savoir étudier une suite vérifiant une relation de récurrence linéaire d'ordre n à coefficients constants et connaître la forme générale des solutions de $au_{n+2}+bu_{n+1}+cu_n=0$. Le théorème de Cayley-Hamilton n'est pas au programme. Les notions de polynôme annulateur et de polynôme minimal pour un endomorphisme ou une matrice ne sont pas au programme. La décomposition de Jordan n'est pas au programme. Aucun résultat spécifique à la trigonalisation n'est au programme.</p>
<p>4 - Géométrie</p> <p>Espaces affines de dimensions 2 et 3</p> <p>Définition, applications et transformations affines. Repères cartésiens, équations de droites et de plans. Barycentres et utilisation des coordonnées barycentriques.</p> <p>Espaces vectoriels Euclidiens de dimension finie</p> <p>Produit scalaire et norme Euclidienne, sous espaces orthogonaux, bases orthonormales. Identification des formes linéaires et des vecteurs. Orientation et produit vectoriel. Projections orthogonales. Transformations orthogonales et matrices orthogonales. Toute matrice symétrique réelle, A, est diagonalisable sur \mathbf{R} et $A=QD^tQ$, avec Q orthogonale (la démonstration de ce théorème n'est pas exigible des candidats). Angle de deux vecteurs dans le plan orienté et angle de deux vecteurs dans l'espace.</p> <p>Géométrie affine Euclidienne en dimensions 2 et 3</p> <p>Distances, angles. Aire du parallélogramme et volume du parallélépipède. Définition d'une isométrie. Caractérisation des isométries directes du plan et de l'espace. Similitudes directes du plan : écriture à l'aide des complexes. Cercle et sphère.</p>	

Partie II

Le programme de la partie II complète celui de la partie I. Ainsi, le programme de la partie II est constitué de l'ensemble du programme de la partie I augmenté d'un programme spécifique qui est détaillé ci-après.

	COMMENTAIRES
<p>Analyse</p> <p>1 - Espaces vectoriels normés sur \mathbf{K} avec $\mathbf{K}=\mathbf{R}$ ou $\mathbf{K}=\mathbf{C}$. Généralités</p> <p>Définitions Définition d'une norme sur un espace vectoriel réel ou complexe de dimension finie ou non. Définition d'une partie bornée. Exemple des normes usuelles N_1, N_2 et N_∞ sur \mathbf{K}^n et sur $C([a,b],\mathbf{K})$. Définition de la distance associée à une norme et des boules. Définition de l'équivalence de deux normes.</p> <p>Sur un espace vectoriel réel ou complexe de dimension finie toutes les normes sont équivalentes.</p> <p>Définition d'une suite, d'une suite convergente et d'une suite divergente. Espace vectoriel des suites convergentes et opérations algébriques sur les limites.</p> <p>Définition d'une partie ouverte non vide (réunion de boules ouvertes). Définition d'un point intérieur à une partie et de l'intérieur d'une partie. Définition d'une partie fermée : son complémentaire est une partie ouverte.</p> <p>Continuité d'une application $f \in F(A, E)$ en un point $a \in A$ et espace vectoriel $C(A, E)$.</p>	<p>La définition générale d'un espace topologique ou d'un espace métrique est hors programme. Les candidats doivent connaître les définitions usuelles suivantes relatives aux espaces normés, aucune autre définition topologique n'est exigible.</p> <p>La démonstration de l'équivalence des normes en dimension finie n'est pas exigible des candidats. La notion de norme subordonnée sur un espace d'applications linéaires n'est pas au programme. La notion de partie compacte n'est pas au programme. La notion d'espace de Banach n'est pas au programme. La caractérisation de la continuité par image réciproque des ouverts ou des fermés n'est pas au programme du concours.</p>
<p>2- Dérivation et intégration des fonctions définies sur un intervalle I de \mathbf{R} et à valeurs dans \mathbf{K}^n</p> <p>Calcul différentiel Définition de la dérivée en un point, de la dérivée à droite et à gauche. Caractérisation de la dérivabilité par la dérivabilité des fonctions coordonnées. Espace vectoriel $C^r(I, \mathbf{K}^n)$ et algèbre $C^r(I, \mathbf{K})$.</p> <p>Inégalité des accroissements finis pour une fonction $f \in C^1(I, \mathbf{K}^n)$. Formule de Taylor-Young pour une application de classe $C^r(I, \mathbf{K}^n)$ et existence du développement limité à l'ordre p d'une application de classe C^r.</p>	<p>Toutes les applications dont il est question ici sont définies sur un intervalle I de \mathbf{R} et à valeurs dans l'espace vectoriel \mathbf{K}^n avec $\mathbf{K}=\mathbf{R}$ ou $\mathbf{K}=\mathbf{C}$.</p>

	COMMENTAIRES
<p>Calcul intégral Définition de l'intégrale d'une fonction continue par morceaux $f : [a, b] \rightarrow \mathbf{K} : \int_a^b f(t) dt = (\int_a^b f_1(t) dt, \dots, \int_a^b f_n(t) dt)$, où les f_i sont les fonctions coordonnées. Linéarité de l'intégrale et relation de Chasles, inégalité : $\left\ \int_a^b f(t) dt \right\ \leq \int_a^b \ f(t)\ dt$ et inégalité de la moyenne. Changement de variable. Formule de Taylor-Lagrange à l'ordre p avec reste intégral pour une application de classe C^{p+1}.</p>	
<p>3 - Suites et séries de fonctions définies sur un intervalle à valeurs dans \mathbf{K} Définition de la convergence uniforme d'une suite de fonctions définies sur I à valeurs dans \mathbf{K}. Critère de Cauchy de convergence uniforme. La limite uniforme d'une suite de fonctions bornées sur I est bornée sur I et celle d'une suite de fonctions continues sur I est continue sur I. Théorème d'intégration : si (f_n) est une suite de fonctions de classe $C^0([a, b], \mathbf{K})$ qui converge uniformément sur $[a, b]$, alors : $\lim \int_a^b f_n(t) dt = \int_a^b \lim f_n(t) dt$. Théorème de dérivation : si (f_n) est une suite de fonctions de classe $C^1([a, b], \mathbf{K})$ qui converge simplement en un point $x \in [a, b]$ et qui est telle que la suite (f'_n) converge uniformément sur $[a, b]$ vers une fonction g, alors (f_n) admet une limite uniforme f sur $[a, b]$, f est de classe $C^1([a, b], \mathbf{K})$ et $f' = g$. Extension aux suites de fonctions de classe C^p ($p \geq 1$).</p>	<p>Toutes les applications dont il est question ici sont définies sur un intervalle I de \mathbf{R} et à valeurs dans l'espace vectoriel \mathbf{K} avec $\mathbf{K} = \mathbf{R}$ ou $\mathbf{K} = \mathbf{C}$.</p>
<p>Définition de la convergence uniforme d'une série de fonctions, f_n, définies sur I. Critère de Cauchy de convergence uniforme. Définition de la convergence normale d'une série de fonctions bornées sur I. Toute série normalement convergente sur I, est uniformément convergente sur I. Utilisation d'une série majorante pour établir la convergence normale. Théorèmes de dérivation et d'intégration terme à terme pour les séries de fonctions de $C^1([a, b], \mathbf{K})$ et $C^0([a, b], \mathbf{K})$ respectivement.</p>	
<p>4 - Intégrales dépendant d'un paramètre Théorème de continuité : Soit $f \in C^0(I \times [a, b], \mathbf{K})$. Alors la fonction : $x \in I \rightarrow \int_a^b f(x, t) dt$ est continue sur I. Théorème de dérivation : Soit $f \in C^0(I \times [a, b], \mathbf{K})$ telle que $\frac{\partial f}{\partial x} \in C^0(I \times [a, b], \mathbf{K})$. Alors la fonction : $g : x \in I \rightarrow \int_a^b f(x, t) dt$ est dans $C^1(I, \mathbf{K})$ et : $g'(x) = \int_a^b \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) dt$. Théorème de Fubini : $f \in C^0(I \times [a, b], \mathbf{K})$. Alors pour tout $[c, d] \subset I$: $\int_c^d \int_a^b f(x, t) dt = \int_a^b \int_c^d f(x, t) dt$.</p>	<p>Seuls les trois théorèmes suivants sont au programme, leurs démonstrations ne sont pas exigibles des candidats. I est un intervalle de \mathbf{R} et $\mathbf{K} = \mathbf{R}$ ou $\mathbf{K} = \mathbf{C}$.</p>

	COMMENTAIRES
<p>5 - Intégrales généralisées dépendant d'un paramètre</p> <p>Extension de la notion de fonction continue absolument intégrable au cas des fonctions à valeurs complexes.</p> <p>Théorème de continuité : Soit $f \in C^0(I \times J, \mathbf{K})$.</p> <p>S'il existe $\varphi \in C^0(J, \mathbf{R})$ absolument intégrable sur J telle que :</p> <p>$\forall (x, t) \in I \times J : f(x, t) \leq \varphi(t)$, alors la fonction :</p> <p>$x \in I \rightarrow \int_J f(x, t) dt$ est dans $C^0(I, \mathbf{K})$</p> <p>Théorème de dérivation : Soit $f \in C^0(I \times J, \mathbf{K})$ telle que</p> <p>$\frac{\partial f}{\partial x} \in C^0(I \times J, \mathbf{K})$. Si f et $\frac{\partial f}{\partial x}$ vérifient toutes deux l'hypothèse du théorème précédent, alors la fonction $g : x \in I \rightarrow \int_J f(x, t) dt$ est dans $C^1(I, \mathbf{K})$ et : $g'(x) = \int_J \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) dt$.</p>	<p>Seuls les deux théorèmes suivants sont au programme, leurs démonstrations ne sont pas exigibles des candidats. I et J sont deux intervalles de \mathbf{R} et $\mathbf{K}=\mathbf{R}$ ou $\mathbf{K}=\mathbf{C}$</p>
<p>6 - Compléments sur les séries de nombres réels ou complexes</p> <p>Définition du produit de Cauchy de deux séries. Convergence de la série produit de deux séries absolument convergentes.</p>	<p>La démonstration n'est pas exigible des candidats.</p>
<p>7 - Compléments sur les séries entières</p> <p>Définition d'une série entière $\sum a_n z^n$ de la variable complexe z associée à la suite de nombres complexes a_n. Définition du rayon de convergence R. Pour $R > 0$: la série est absolument convergente sur la boule ouverte $B(0, R)$ de centre 0 et de rayon R, normalement convergente sur toute partie fermée bornée de $B(0, R)$ et sa somme est continue sur $B(0, R)$. Somme et produit de deux séries entières de rayons strictement positifs. Relation $\exp(z) = \sum z^n / n!$.</p> <p>Développement en série entière des fonctions usuelles de la variable complexe : sin, cos, sinh, cosh et $z \rightarrow 1/(1+z)^n$ (n entier) et rayons de convergence.</p>	
<p>8 - Séries de Fourier</p> <p>Espace $C_{2\pi}$ des fonctions à valeurs complexes, définies et continues sur \mathbf{R}, périodiques de période 2π.</p> <p>Produit scalaire $(f, g) \in C_{2\pi} \rightarrow \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \bar{f}g$ et norme quadratique moyenne.</p> <p>La famille $e_n : t \rightarrow \exp(int)$ est orthonormale dans $C_{2\pi}$.</p> <p>Définition des coefficients de Fourier, $C_n = (f, e_n)$ d'une fonction $f \in C_{2\pi}$.</p> <p>Cas d'une fonction paire ou impaire. Définition de la série de Fourier de $f \in C_{2\pi}$. La somme partielle $S_n(f)$ est la projection orthogonale de f sur $\text{Vect}(e_{-n}, \dots, e_n)$. Relation de Pythagore : $\forall P \in \text{Vect}(e_{-n}, \dots, e_n) : (\ P-f\ _2)^2 = (\ P-S_n(f)\ _2)^2 + (\ S_n(f)-f\ _2)^2$ et inégalité de Bessel.</p> <p>Extension au cas des fonctions continues par morceaux.</p>	

	COMMENTAIRES
<p>Seuls les deux théorèmes de convergence suivants sont au programme. Leurs démonstrations ne sont pas exigibles des candidats.</p> <p>Convergence ponctuelle, Théorème de Dirichlet : Si f est une fonction de période 2π et de classe C' par morceaux, alors, en tout point $x \in \mathbf{R}$, sa série de Fourier converge vers $(f(x^+) + f(x^-))/2$.</p> <p>Convergence en moyenne quadratique, Théorème de Parseval : Si f est une fonction de période 2π, continue par morceaux, alors sa série de Fourier converge en moyenne quadratique vers f.</p> <p>On a : $(\ f\ _2)^2 = \sum c_n ^2$.</p>	
<p>9 - Compléments sur les équations différentielles</p> <p>Résolution de l'équation $ay'' + by' + cy = f$, où (a, b, c) sont des constantes réelles ou complexes et où f est une fonction continue.</p> <p>Cas général : méthode de variations des constantes.</p> <p>Equation $ay'' + by' + cy = f$, où (a, b, c, f) sont des fonctions continues sur l'intervalle I de \mathbf{R} à valeurs réelles ou complexes, lorsque a ne s'annule pas sur I : structure des solutions, wronskien et expression générale des solutions quand on connaît une solution de l'équation homogène ne s'annulant pas sur I (l'existence et unicité de la solution du problème de Cauchy est admise).</p> <p>Résolution de l'équation $X' = AX + B(t)$ où A est une matrice carrée réelle ou complexe diagonalisable, à coefficients constants et B une fonction continue.</p>	
<p>10 - Compléments sur les fonctions de plusieurs variables réelles</p> <p>Calcul différentiel</p> <p>Définition d'une dérivée partielle. Définition d'une application de classe C' sur un ouvert et espace vectoriel $C'(\Omega, \mathbf{R}^p)$.</p> <p>Théorème fondamental : une application de classe C' sur Ω admet en tout point une différentielle (la démonstration n'est pas exigible des candidats). Matrice jacobienne. Définition d'une application de classe C' et théorème de Schwarz (admis).</p> <p>Dans le cas où $n=p$: définition du jacobien, de la divergence et du rotationnel ($n=p=3$).</p> <p>Dans le cas où $p=1$: définition du gradient et des points critiques d'une application de $C'(\Omega, \mathbf{R})$, condition nécessaire d'existence d'un extremum local.</p> <p>Définition d'un changement de variables : C'-difféomorphisme entre deux ouverts de \mathbf{R}^n. Théorème fondamental (admis) : une injection de classe C', $\phi : \Omega \subset \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^n$, est un C'-difféomorphisme de Ω si et seulement si son jacobien est non nul sur Ω. Exemples et pratique de changement de variables dans \mathbf{R}, \mathbf{R}^2, et \mathbf{R}^3 (polaires, cylindriques, sphériques en particulier).</p>	<p>On considère des fonctions définies sur un ouvert Ω de \mathbf{R}^n à valeurs \mathbf{R}^p dans ($p \geq 1$).</p>

COMMENTAIRES

Calculs d'intégrales doubles

Pavages du plan et définition d'un domaine élémentaire ($D = \{a \leq x \leq b; \phi_1(x) \leq y \leq \phi_2(x)\}$, ou $D = \{a \leq y \leq b; \phi_1(y) \leq x \leq \phi_2(y)\}$ avec ϕ_i continues par morceaux). Calcul d'intégrales doubles de fonctions continues sur un domaine élémentaire ou sur une réunion disjointe de domaines élémentaires : intégration par tranches. Interprétation géométrique de l'intégrale double. Application aux calculs d'aires, de centres et de moments d'inertie. Changement de variables dans les intégrales doubles ; utilisation des coordonnées polaires.

Il s'agit uniquement d'une pratique de calcul. Aucune question théorique sur ce point, en particulier sur la construction de l'intégrale double ne pourra être soulevée. Seule la pratique du calcul sur des domaines élémentaires, ou sur des domaines qui s'y ramènent par changement de variables, est exigible des candidats.

11 - Arcs paramétrés plans

Définition d'un arc paramétré plan de classe C^k : application $\gamma: t \in I \rightarrow (\gamma_1, \gamma_2) \in \mathbf{R}^2$, où I est un intervalle de \mathbf{R} et où les fonctions coordonnées (γ_1, γ_2) sont de classe C^k . Changement de paramétrage, orientation. Étude locale : tangente, position locale de la courbe par rapport à sa tangente ; branches infinies : asymptotes et direction asymptotiques. Représentation polaire d'un arc paramétré de classe C^1 , quand $\gamma: I \rightarrow \mathbf{R}^2 - \{(0,0)\}$. Calcul de la vitesse et de l'accélération dans le repère polaire, définition du vocabulaire cinématique usuel. Arc plan défini par une équation polaire $\theta \rightarrow \rho(\theta)$, où ρ est de classe C^k : seul le calcul de la tangente ou de la normale dans le repère polaire est exigible des candidats.

Aucun théorème général pour ces études n'est exigible des étudiants.

12 - Compléments de géométrie

Espaces préhilbertiens

Définition d'un produit scalaire Euclidien ou Hermitien (semi-linéarité à gauche). Inégalité de Cauchy-Schwarz, inégalité triangulaire, égalité du parallélogramme ; norme et distance associées. Orthogonalité, projecteurs orthogonaux, relation de Pythagore et inégalité de Bessel.

Espaces Euclidiens de dimension finie

Définition de l'adjoint d'un endomorphisme et propriétés de la "transposition". Isomorphisme entre E et E^* . Définition d'un endomorphisme symétrique et caractérisation des projecteurs orthogonaux. Définition et caractérisations d'un automorphisme orthogonal et d'une matrice orthogonale. Réduction des endomorphismes symétriques.